



Acker-Ringelblume

lat. : *Calendula arvensis*

Aussaat im Frühjahr

blüht zwischen April und Oktober

trockene, halbschattige Standorte

Heilpflanze



Acker-Vergissmeinnicht

lat.: *Myosotis arvensis subsp. arvensis*

Aussaat im Mai, Juni oder August

Blütezeit im Frühsommer

schattiger oder halbschattiger Standort

Heilpflanze



Echte Kamille

lat.: *Matricaria recutita*

Aussaat im Frühjahr oder im Herbst

blüht zwischen Mai und September

sonniger Standort

trockene Blüten können zu Tee verarbeitet
werden



Große Kapuzinerkresse

lat.: *Tropaeolum majus*

Aussaat: Ende Mai

Standort: sonnig bis halbschattig

Blüten und Blätter sind essbar



Kornblume

lat.: *Centaurea cyanus*

Aussaat zwischen März und April

blüht zwischen Juni und Juli

trockene, sonnige bis halbschattige Standorte



Sonnenblume

lat.: *Helianthus annuus* Peredovik

Aussaat im Frühjahr

blüht zwischen Juni und Oktober

windgeschützter und sonniger Standort

getrocknete Kerne sind essbar

KlimaBildung goes ...



Klatschmohn

lat.: *Papaver rhoeas*

blüht zwischen Mai und Juli



Gemeine Akelei

lat.: *Aquilegia vulgaris* agg.

Aussaat zwischen März und Juni

blüht Ende Mai und Juli

halbschattiger Standort



Wiesen- Kerbel

lat.: *Anthriscus sylvestris* s. str.

Aussaat Anfang März

blüht zwischen Mai und Juli

sonnige bis halbschattige Standorte

Blätter und Wurzeln sind essbar und können
als Gemüse verwendet werden.